



I.sz. Belgyógyászati Klinika
Igazgató: Prof. dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár
Angiológiai Osztály
Vezető: Prof. Dr. Késmárky Gábor egyetemi tanár
7624 Pécs Ifjúság út 13. Tel.: 72/536-000/32615,32616 Fax: 72/536-148

A M B U L Á N S L A P

024322721

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési név.....: Esetszám.: 17125052
Születési dátum...: 1963.12.18 TAJ.....: **025-293-434**
Születési hely....: Siklós Naplósám.: 01001111
Anyja neve.....: Baranyai Lídia
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16.
Felvételi dátum...: 2022.08.12 09:32 Állampolgárság: HUN
Beküldő.....: 024322721 Térítési kategória: 1

Diagnózis

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
I8280	Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa	N
I8290	K.m.n. véna emboliája és thrombosisa	N

Beavatkozások

11041	Vizsgálat	1	750
12601	EKG végtag és mellkaselvezetéssel	1	308
89442	Pulzoxymetria	1	582

Anamnézis

1995-ben igazolódott Crohn betegség (colitis ulcerosa) igazolódott (jobb colonfél ceruzányi szűkülete volt). Kezdetben véres volt a széklete, egyéb tünetet nem tapasztalt (hasmenés, fájdalom vagy láz nem volt). Vízérműtét a lábon 20-on éves korában. 2-3 éve hypetonia. 2012.05.02. colonoscopia szövettanilag is igazolt chronicus colitises jeleket igazol colitis ulcerosára jellemző képpel. 2014.10.08. A calprotectin mérés eredménye: 208 ug/g A calprotectin mérés eredményének értékelése: >200ug/g: pozitív. DEXA történt, normál tartományú csontsűrűség. 2015.01. Colonoscopia: középsúlyos M. Crohn a terminalis ileumban és a colon ascendensben.

2019.novemberben: bal v. poplitea mélyvénás thrombosis igazolódott Siklói Sebészeti rendelésen Duplex UH scan és klinikum alapján. Anticoagulánst nem kapott.

2020. jan. Clexan inj., majd Apixaban 2x2,5 mg

2022.01.: Érsebészet:

Javasolt combtőig érő kompr. harisnya rendszeres viselése, Detralex 2x1 szedése.

Jobb AV-i varicectomia mérlegelendő, jelenleg a nem teljes fe-popl. mélyvénás recanalisatio és a hegesen stenosisált-occludált VSP miatt egyelőre halasztása javasolt.

Gyógyszerei: Prelow 1x1, Salazopyrin EN 2x500(10 éve szedi) naponta 2x1000 mg, Apo-Famotidin 2x40 mg, Imuran 200 mg, Eliquis 2x2,5 mg.

Gyógyszerérzékenység: nem tud róla. Salofalk mellett gyógyszerundor.

Családban VTE nem fordul elő.

Dohányos napi 1 doboz.

Jelen panaszok:

Állapotát kielégítőnek tartja, fizika terhelhetősége jelentősen nem csökkent. Jobb alsóvégtag dagad, ha nem használja a harisnyát. Alsóvégtagi fájdalom nincs. Eszméletvesztés nem volt, szédülés, szivritmuszavar érzés nincs.

Jelen státusz:

varicositas l.u. krónikus vénás elégtelenség jelei, száraz bőr. barnás bőrpigmentáció. körfogatkülönbség jelenleg is

Egyéb vizsgálatok:

EKG: Sinusrhythmus, fr.: 62/min. PR: 140 ms, QRS: 98 ms, QTc: 430 ms, isoelektromos ST szakaszok, II lapos T, III-ban neg. T V5-6 ban lapos T hullámok

SpO2: 97-97 %

RR: 116/74Hgmm

Epikrízis:

Kardiológiai további kivizsgálása jelenleg az elsődleges. Jobb alsó végtagi kompressziós harisnya viselése combtőig javasolt. Jobb alsó végtagi varicectomia egyenlőre halasztandó.

Kontroll vizsgálat időpontja: 2023.08.11 10:00 B181 22721 I.Belkl. Angiológia

Javaslat:

Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, ha az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak

- ELIQUIS 2,5 MG FILMTABLETTA 60x

EÜ70%. Indikációs pontszám: 28. BNO: Z2980. Érvényesség: 12 hónap

Felírt gyógyszer:

2022.08.12	Maxis Micro AG combtőig érő	.	2.0
	harisnya (standard) darab		
2022.08.12	Maxis Micro AG combtőig érő	.	2.0
	harisnya (standard) darab		

Pécs, 2022.08.12

.....
Endrei Dóra Dr.
48069
egyetemi docens
belgyógyász angiológus

Táppénz igénye esetén 48 órán belül kezelési lapunkkal családorvosánál jelentkezzen!

A kórismére és a kezelési tervre vonatkozó szükséges tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem.

Az aktuális ambulánslap egy példányát átvettem.

.....
beteg aláírása