



Kaptopril (ACEOMEL) tablettá 12,5 mg

Hatóanyag: 12,5 mg kaptopril tablettánként.

Gyógyszerforma: fehér színű, korong alakú, lapos felületű tablettá. Törési felülete: fehér színű.

Gyógyszercsoport: Angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátló.

Hatása: A kaptopril az angiotenzin I-konvertáló enzim nagyon specifikus, kompetitív gátlója (ACE-gátló). A perifériás érellenállás csökkentése révén csökkenti a vérnyomást.

Javallat: hypertensio az eljárási rendben részletezett esetekben

Mentőápoló a vérnyomás csökkentésére a vonatkozó eljárásrendben meghatározott indikáció fennállása esetén akkor adhatja, ha:

- **nincsenek neurológiai tünetek**

ÉS

- NIBP_{sys} (szisztolés vérnyomás) > 220 Hgmm és/vagy
- NIBP_{dias} (diasztolés vérnyomás) > 120 Hgmm.

Adagolás:

- *Felnőttek:* 1 tablettá (12,5 mg). A tablettát a szájüregben kell tartani, annak elolvadásáig, vagy kevés folyadékkal le kell nyelni.
- *Gyerekek* mentőápoló nem adhatja!

Ellenjavallat:

- A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával (**pl. laktóz**), illetve bármely ACE-gátlóval szembeni túlérzékenység.
- Bármely ACE gátlóval történt kezelés kapcsán kialakult angioneuroticus oedema az anamnézisben.
- Örökletes vagy idiopathiás angioneuroticus oedema.
- Az Aceomel egyidejű alkalmazása aliszkiren tartalmú készítményekkel ellenjavallt.
- Ismert aorta- vagy aortabillentyű-szűkület.
- Terhesség és szoptatás.

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:

- Az ACE-gátlók és angiotenzin II receptor blokkolók nem alkalmazhatók egyidejűleg diabeteses nephropathiában szenvedő betegeknél.
- Ritkán előforduló, örökletes galaktóz intoleranciában, laktóz-intoleranciában vagy glükóz-galaktóz malabszorpcióban a készítmény nem szedhető.

Terhesség és szoptatás: ACE-gátló alkalmazása ellenjavallt terhességben és szoptatás időszakában.

Mellékhatások:

- száraz, non-produktív köhögés,
- a vérnyomás átmeneti túlzott csökkenése (főként egyéb vérnyomáscsökkentő szereket szedő betegeken),
- gyógyszer-túlérzékenységi reakció (pl. kiütés, arc kipirulása, viszketés stb.).

Különleges tárolási előírások: legfeljebb 25°C -on, nedvességtől védve tárolandó.

Felhasznált irodalom:

1. Pharmindex. Aceomel. In: Pharmindex. Budapest: Vidal Next Kft.; 2020 [updated 2020 June].
2. <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> 2020. 06. 18.